

FRONTLINE® COMBO 50,00 mg / 60,00 mg solución spot-on para gatos. **Composición:** Cada pipeta (0,5 ml) contiene: Fipronilo 50,00 mg; (S)-metopreno 60,00 mg. **Especies de destino:** Gatos y hurones. **Indicaciones:** Gatos: Infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Hurones: Infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas. **Contraindicaciones:** No usar en gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg ni en hurones de menos de 6 meses de edad. No usar en animales enfermos (ej. enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No usar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. No usar en casos de hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. **Gestación y lactancia:** Puede utilizarse durante la gestación en gatos. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable en hurones. **Acontecimientos adversos:** Muy raros: Reacciones transitorias en el punto de aplicación (descamación, pérdida de pelo, picor, enrojecimiento). Picor generalizado o pérdida de pelo. Hipersalivación, vómitos. Aumento de la sensibilidad a la estimulación, depresión u otros signos nerviosos. **Posología:** Unción dorsal puntual (spot-on). La dosis mínima es de una pipeta (0,5 ml) por gato, correspondiente a 5 mg/kg de fipronilo y de 6 mg/kg de (S)-metopreno, y una pipeta (0,5 ml) por hurón, correspondiente a 50 mg de fipronilo y 60 mg de (S)-metopreno. El intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas. **Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos del animal. Asegurarse de que el medicamento se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse, y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento. No se recomienda bañar a los animales dentro de los dos días después de la aplicación del medicamento. **Conservación:** No conservar a temperatura superior a 25 °C. Conservar en el envase original. **Nº autorización:** 1538 ESP. Presentación: 3 y 6 pipetas de 0,5 ml en blísteres. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria. En caso de duda consulte a su veterinario.**