

FRONTLINE® SPRAY 2,5 mg/ml solución para pulverización cutánea. **Composición:** Cada ml contiene: Fipronilo 2,5 mg. **Especies de destino:** Perros y gatos. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas en perros y gatos. Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador en perros y gatos. Frontline Spray elimina las pulgas del animal tratado, por lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas. **Contraindicaciones:** No usar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes. No usar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte. No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. **Gestación y lactancia:** Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. **Acontecimientos adversos:** En muy raras ocasiones pueden aparecer reacciones transitorias en el punto de aplicación (eritema, prurito o alopecia), vómitos, síntomas respiratorios o desordenes neurológicos reversibles (hiperestesia, letargia o ataxia). En caso de lamido, puede observarse un breve periodo de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente. **Posología:** Aplicar de 3 a 6 ml/kg de peso vivo (equivalente a 7,5 a 15 mg de fipronilo/kg, dependiendo de la longitud del pelo del animal: 3 ml/kg de peso vivo para animales de pelo corto y hasta 6 ml/kg para animales de pelo largo), es decir de 2 a 4 pulverizaciones/kg de peso para el spray de 250 ml y 500 ml y 6 a 12 pulverizaciones/kg para el spray de 100 ml. Pulverizar toda la superficie del animal manteniendo el frasco a una distancia de 10-20 cm. Repartir de manera uniforme y a contrapelo para que todo el animal quede mojado. Friccionar después de la aplicación para que el medicamento penetre hasta la piel. **Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos del animal. Es importante asegurarse de que los animales no se lamen unos a otros después del tratamiento. Puede haber una adhesión de garrapatas solas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables. No se debería permitir que los perros se bañasen en arroyos o estanques durante los 2 días después de la aplicación. **Nº autorización:** 1084 ESP. **Formatos:** 100 y 250 ml. **Titular:** Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.** En caso de duda consulte a su veterinario.