

FRONTPRO comprimidos masticables para perros. **Composición:** Cada comprimido masticable contiene: afoxolaner 11,3 mg (para perros 2-4 Kg); afoxolaner 28,3 mg (para perros >4-10 Kg); afoxolaner 68,0 mg (para perros >10-25 Kg); afoxolaner 136,0 mg (para perros >25-50 Kg). **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) durante 5 semanas y garrapatas (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*) durante un mes. Las pulgas y las garrapatas deben adherirse al hospedador y comenzar a alimentarse para quedar expuestas al principio activo. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. **Gestación y lactancia:** Puede utilizarse en perras reproductoras, gestantes y lactantes. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en machos reproductores, utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Reacciones adversas:** Muy raros: Signos neurológicos (convulsiones, ataxia y temblores musculares), prurito, letargia, o anorexia, y trastornos del tracto digestivo leves (vómitos, diarreas). La mayoría de las reacciones adversas fueron de resolución espontánea y de corta duración. **Posología:** Vía oral. A una dosis de 2,7–7 mg/kg de peso. Para perros de más de 50 kg de peso, utilizar la combinación adecuada de comprimidos masticables de igual o diferente concentración. Los comprimidos no deben fraccionarse. Administración mensual. **Precauciones:** Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable antes de tratar a cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o de perros que pesen menos de 2 kg. **Nº autorización:** EU/2/19/240-/002; -/006; -/010; -/014. **Presentación:** Una caja contiene un blíster de 3 comprimidos masticables. **Titular:** Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria. En caso de duda consulte a su veterinario.**